

Przygotowanie do gastroskopii
Badanie w godzinach popołudniowych

1. W dniu badania można zjeść wczesne lekkie śniadanie, następnie należy powstrzymać się od jedzenia, 8 godzin przed badaniem należy pozostać na czczo, zakończyć picie płynów na cztery godziny przed planowanym badaniem. W dniu badania nie zaleca się spożywania napojów mlecznych.
2. W dniu badania może być wskazane odstawienie niektórych leków przeciwwkrzepliwych - zalecana konsultacja z lekarzem
3. Celem jak najlepszej oceny endoskopowej conajmniej 2 tygodnie przed planowanym badaniem wskazane jest odstawienie (jeżeli były wcześniej stosowane) leków typu inhibitory pompy protonowej - o ile lekarz nie zaleci inaczej.
4. W przypadku gdy przed gastroskopią były stosowane antybiotyki (nie dotyczy kropli do oczu i maści skórnych) zalecane jest również, by wykonać gastroskopię nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu leczenia – o ile lekarz nie zaleci inaczej.
5. Nie należy przynosić do pracowni rzeczy wartościowych lub biżuterii, ponieważ personel nie odpowiada za ich zniszczenie lub zagubienie.
6. W przypadku badania wykonywanego w znieczuleniu ogólnym wskazana jest opieka drugiej osoby, nie wolno w tym dniu prowadzić pojazdów mechanicznych.